

HIYAR VE DOMATESTE MİLDİYÖ

Tanımı ve Zarar Şekli

Hıyar ve Domateste Mildiyö; Bitki yaprakları üzerinde önce küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde belirir. Hastalık ilerledikçe bu lekeler koyulaşır, yaprağın alt yüzünde bu lekelerin tam altında gri veya meşke renginde bir küf oluşur. Hastalanan yapraklar sararır sonra kahverengine dönüşür, sonuçta bitki tamamen ölür.

İlimizin rutubetli oluşu sebebiyle de önemli ürün kayıplarına neden olur.



Midiyöye Yakalanmış Bir Hıyar Tarlası

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

Sık tohum ekimi yapmamak, tarlada veya serada sürekli çapa yaparak, yabancı otların ortadan kaldırılması, hastalıklı bitkilerin toplanıp seradan uzaklaştırılması veya derin bir çukura gömülmesi gibi bir takım bakım işlerinin yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bitkilerde ilk mildiyö belirtileri görülür görülmez İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurularak uygulamalarla ilgili gerekli bilgiler alınmalıdır.

DANABURNU (KESEĞEN)

TANIMI VE ZARAR ŞEKLİ

İlkbaharda bilhassa NİSAN-MAYIS-HAZİRAN aylarında fidelik ve sebze bahçelerinde geniş tahribat yapan DANABURNU'nu (Keseğen) tanımayan bahçe sahibi yoktur.

DANABURNU (Keseğen) zararlısı toprak içinde galeri açarak ilerlerken her türlü bitkinin köklerini ve yumrularını yerler, yeni dikilen sebze fidelerini kesmek sureti ile zarar yapar.

BİR DEKAR YER İÇİN: 8-10 kg kepek naylon örtü veya düz beton üzerine serilerek su ile karıştırılıp nemlendirilir. Nemlendirilen kepeğe 500 gr toz şeker serpilerek kürekle iyice karıştırılır. Tavsiye edilen ilaçlardan birinin ilavesinden sonra azar azar su katılarak karıştırılıp zehirli yem elde edilir.



Danaburnu Ergin ve Larvası

1 Dekar Alan İçin Kullanılacak

Hazır Yem İçin İLAÇ+KEPEK+ŞEKER

Karışımı

CHLORPYRİFOS ETHYL %25 WP

10 kg kepek

+

400 gr ilaç

+

500 gr şeker

Hazırladığımız zehirli yem bahçe akşamüstü sulandıktan sonra lastik eldivenle 1 dekara 8-10 kg zehirli yem düşecek şekilde, öbek öbek toprak üstüne bırakılır.

Kepekli yem kullanırken bitkilerin üzerine gelmemesine ve sebze kök boğazına değmemesine dikkat edilmelidir.



Danaburnu Ergini

YAPRAK BİTLERİ

Bitki özsuğunu emmek suretiyle zarar yaparak, yaprakların içe doğru kıvrılmasına neden olurlar.

Kimyasal Mücadele: Bitkilerde yaprak biti görüldüğünde ve yapılan takipler sonucunda kimyasal mücadele yapılması gerektiğine karar verildiğinde çiftçilerimizin mutlaka İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize danışmaları gerekmektedir.



Yaprak Biti

Detaylı Bilgi için İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize Başvurunuz.

Yeni Mahalle Cizre
Caddesi Merkez/ŞIRNAK
Tel : 0486 216 2085
Fax : 0486 216 2084
sirnak@tarimorman.gov.tr

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



ÖNEMLİ SEBZE HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE



2019